



日本薬局方



内袋:PE

大晃生薬有限公司

名古屋市千種区松軒一丁目5番12号

【用法及び用量】

大人（15歳以上）は1日1回0.375～0.75g
をなるべく就寝前に服用する。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみ
ながら少しずつ増量、又は減量する。

【効能又は効果】

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、
吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常
醗酵、痔

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

第②類医薬品

日本薬局方

センナ末

内容量 500g

Lot.



4 987716 137151

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：フリーダイヤル 0120-149-931

保管及び取扱い上の注意

- (1) 本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。…他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人…はげしい腹痛、悪心・嘔吐

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。…下痢

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になります。)
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。