

大晃生薬有限会社

名古屋市千種区松軒一丁目5番12号

【用法及び用量】大人（15歳以上）は1日1回0.75  
～1.5gをなるべく就寝前に服用する。  
ただし初回は最小量を用い、便通の具合  
や状態をみながら少しずつ増量又は減量す  
る。

【効能又は効果】便秘  
便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼ  
せ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減  
退）、腹部膨満、腸内異常發酵、痔

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

日本薬局方

医薬品

ダイオウ末

RHEI RHIZOMA PULVERATUM

内容量 500g

LOT. No



4 987716 141158

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。



### 使用上の注意

D

#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。…他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。

#### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (5) 次の症状のある人…はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ    |
| 消化器  | はげしい腹痛、悪心・嘔吐 |

- (2) 1 週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。…下痢

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になります。）
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。