

△使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、他の瀉下薬(下剤)を服用しないでください。

☒ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人

(3) 次の症状のある人: 激しい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、激しい腹痛、吐き気・嘔吐があらわれた場合は、副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

3. 服用後、下痢の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

4. 1週間ぐらい服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

● 効能・効果: 便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物

● 用法・用量: 成人(15歳以上)は、1日量 15g を水約 600mL で煮て、約 400mL に煮つめ、かすをこして取り去り、食前または食間に、3回に分けて服用してください。

● 保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

2. 小児の手の届かない所に保管してください。

3. 誤用防止、品質保持のため、他の容器に入れ替えないでください。

4. 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

5. 本品は天産物ですので、吸湿してカビが生えたり、虫が発生したりすることがあります。開封後の保管には、十分に注意してください。

ご購入の時点で、万一、このような異常が見られましたら、お手数ですが、ご一報ください。

製造販売元 チベン製薬株式会社

〒567-0073 大阪府茨木市西穂積町3番8号

電話 072-622-2509 FAX 072-625-6320



PE, PA

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

JUU-LA-2