

日本薬局方 センナ末  
ナカジヤ センナ末

第②類医薬品

用法及び用量  
大人(15才以上)は1日1回0.4g～0.7g(さじ1杯)を就寝前に服用してください。(添付のさじ1杯分は約0.5gです。)

効能又は効果

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和(吹出物、のぼせ、痔、肌あれ、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵)

使用上の注意

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - 1)はげしい腹痛又は悪心・嘔吐のある人
  - 2)妊婦又は妊娠していると思われる婦人
  - 3)医師の治療を受けている人
- 服用に際して、次のことに注意してください。
  - 1)定められた用法・用量を守ってください
  - 2)3才未満の小児には服用させないでください
  - 3)本剤の服用により激しい腹痛を伴う下痢の症状があらわれた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
  - 4)1週間間位服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
- 取扱以上の注意
  - 1)小児の手の届かない所に保管してください
  - 2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください
  - 3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください




日本薬局方

センナ末

第②類医薬品

ナカジヤ センナ末

200g



4936246110783

Lot.

使用期限 2020.03

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又は質上吸湿シカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

Pure Drugs  
はるる

第②類医薬品

日本薬局方センナ末  
ナカジヤ

センナ末  
500g

Lot.



4936246100098

使用期限 2020.03

副作用救済制度 TEL0120-149-931

製造発売元

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地02

電話075(231)26334

NAKAJIMASYOYAKU CO.,LTD.



日本薬局方

センナ末

第②類医薬品

ナカジヤ センナ末

100g



4936246100838

使用期限 2020.03

Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又は質上吸湿シカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2