



副作用救済制度 ☎0120-149-931

日本薬局方 センナ末 ナカジマ センナ末

使用上の注意

第②類医薬品

してはいけないこと

1. 本剤を服用中は他の下剤を服用しないこと。
2. 授乳中の方は本剤を使用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること。
3. 大量に服用しないこと。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - ①医師の治療を受けている人。
 - ②妊婦、又は妊娠していると思われる人。
 - ③本人、又は家族がアレルギー体質の人。
 - ④薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ⑤激しい腹痛、悪心、嘔吐の症状のある人。
2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - ①服用後次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心、嘔吐

- ②一週間位服用しても症状がよくなりません。
3. 下痢の症状が続いたりひどくなった場合は、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

服用の際は用法、用量を守ってください。

効能、又は効果

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹き出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔。

用法及び用量

大人（15歳以上）は1日1回、0.2～0.5gをなるべく寝る前に服用して下さい。（添付のサジー杯は約0.5gです。）

保管及び取扱上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
3. 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れ替えないでください。
4. 本品には防虫、防カビのために脱酸素剤を封入していますのでご注意ください。
5. ご購入の際、万一異常がありましたら、お手数ですがお知らせ下さい。

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町 29 番地の 2

製造販売元 中嶋生薬株式会社

TEL.075-231-2633