



日本薬局方 ダイオウ末 ナカジマ ダイオウ末

使用上の注意

第2類医薬品

してはいけないこと

- 本剤を服用中は他の下剤を服用しないこと。
- 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること。
- 大量に服用しないこと。

相談すること

- 次的人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 ①医師の治療を受けている人。
 ②妊娠、又は妊娠していると思われる人。
 ③本人又は家族がアレルギー体質の人。
 ④薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 ⑤激しい腹痛、恶心、嘔吐の症状のある人。
- 次の場合は直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 ①服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、恶心、嘔吐

②一週間位服用しても症状がよくならない場合。

- 下痢の症状が続いたりひどくなった場合は、服用を中止し医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

服用の際は用法、用量を守って下さい

効能、又は効果

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹き出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔。

用法及び用量

大人（15歳以上）は1日1回、0.5～1gをなるべく寝る前に服用して下さい。