

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。



便秘薬

ハイベン

特 徴

ハイベンは、日本薬局方に収載されているセンナ末及びダイオウ末を飲みやすい錠剤にしたものです。便秘に伴う頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物を改善する生薬のダイオウに、ヨーロッパなどで緩下剤として用いられてきたセンナを配合した、おだやかな作用の生薬製剤の便秘薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

効能又は効果

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法及び用量

次の量を食間に、水またはお湯で服用してください。

（食間とは食後2～3時間を指します）

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15 歳以上）	2～3錠	3 回
11 歳以上 15 歳未満	1～2錠	
11 歳未満	服用しないこと	

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤褐色になることがありますが、これは有効成分センノシドによるものであり、異常ではありません。

成分及び分量

本剤9錠中に、次の生薬が含まれています。

日局	センナ末	990mg
日局	ダイオウ末	990mg

添加物として、バレイショデンプン、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）
- (4) ピンの中のとめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (5) 本剤は素錠で、水分が錠剤につくと、表面の一部がとけて、変色又は色むらを生じることがありますので、ぬれた手で取り扱ったり、冷蔵庫などから出してすぐにフタをあげたりしないでください。

包 装

120錠

- 本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

高砂薬業株式会社 お客様相談室
〒541-0045 大阪市中央区道修町1-2-9
電話（06）6231-5414
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2