

ご使用に際して、この説明文書を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

# ラクシースルーエス

第(2)類医薬品  
便秘薬

## 植物繊維（フランタゴ・オバタ種皮末）配合

ラクシースルーエスは、成分のフランタゴ・オバタ種皮末が、腸内で水分を吸収し膨潤します。そして、センナ実末の作用で腸のぜん動運動を促進し、排便を促します。また、シャクヤク末とカンゾウ末の組合せにより下腹部の痛みを和らげる効果を見込まれます。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- 1・本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
- 2・授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
- 3・大量に服用しないこと



#### 相談すること

- 1・次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊娠または妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 次の症状のある人  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- 2・服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- 3・服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢

- 4・1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【効能・効果】

- ・便秘
- ・便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醸酵、痔

## 【用法・用量】

大人(15歳以上)1回1包を1日2回を限度として就寝前または朝の空腹時にコップ1杯の水またはお湯でかまざに服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しづつ增量又は減量すること。

## 【用法・用量に関する注意】

小児には服用させないでください。

## 【成分・分量】

1日量（2包）中

成 分	分 量
プランタゴ・オバタ種皮末	4,500mg
センナ実末	1,500mg
カンゾウ末	750mg
シャクヤク末	750mg

添加物としてパレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、酸化チタン、プロピレングリコール、香料及び三二酸化鉄を含有する。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 天然成分を使用しているため、製造時期により多少色が変わる場合もありますが、品質には問題ありません。
- (5) 使用期限の過ぎたものは服用しないで下さい。

### ＜服用のアドバイス＞

プランタゴ・オバタ種皮末は、水分を吸収し相当量の容積にふくれあがり効果を発揮しますので、必ずコップ一杯の水又はお湯で服用してください。

## 【問い合わせ先】

薬師王株式会社  
東京都大田区池上7-15-4  
電話03-3666-8918  
受付時間／9:00～16:00（土、日、祝日を除く）

発売元

薬師王株式会社  
東京都大田区池上7-15-4

製造販売元 寧葉化学工業株式会社  
奈良県大和高田市旭南町2番25号