

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

下 通 丸

(瀉 下 薬)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
はげしい腹痛、悪心、嘔吐
2. 次の場合には、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

効能・効果

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：

頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法・用量

なるべく空腹時に水又はお湯と一緒に服用します。

服用間隔は4時間以上おいてください。

初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら少しずつ増量又は減量してください。

年 齢	1 回 量	1日の服用回数
成人（15歳以上）	9 ～ 12丸	3回を限度とする
11 ～ 14歳	7 ～ 8丸	
7 ～ 10歳	5 ～ 6丸	
3 ～ 6歳	3 ～ 4丸	
3歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

36丸（成人の1日最大量）中、下記生薬を含有します。

ダイオウ末	----- 2.5g	トウキ末	----- 0.2g
コウボク末	----- 0.1g	オウゴン末	----- 0.1g
ジオウ末	----- 0.2g	キシツ末	----- 0.1g

添加物としてコメデンプンを含有します。

〈成分・分量に関する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7