



日本薬局方

セシナ

g

東京都中央区日本橋本町2-3-5
株式会社 金原市兵衛商店

金原 セシナ

用法・用量

大人(15歳以上)は1日量1.5～3gを熱湯150mlを加え、15分間煮た後、滓をこして取り去り、なるべく就寝前1回服用する。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量する。

効能・効果

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常酸酵、痔

使用上の注意

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)はげしい腹痛又は悪心、嘔吐のある人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
 - (3)医師の治療を受けている人。
2. 服用に際して、次のことに注意してください。
 - 定められた用法・用量を厳守すること。
3. 服用中又は服用後は、次のことに注意してください。
 - (1)本剤の服用により、はげしい腹痛、嘔吐等があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
 - (2)数日間位服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
4. 保管及び取扱い上の注意
 - (1)小児の手の届かない所に保管すること。
 - (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
 - (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。

