


日本薬局方

第②類医薬品

# センナ



第②類医薬品

皇漢堂センナ分包  
(日本薬局方センナ)  
SENNAE FOLIUM

#### 成分・分量

1日分(2包(6g)) 中  
日本薬局方センナ 6g

#### 用法・用量

大人(15歳以上) 1日分1~2包に熱湯150mlを加えて15分間煮た後、袋を取り去り、これを2回に分けて朝夕の空腹時に服用すること。ただし、初回は少量を用い、便通の具合や状態をみながら少しづつ增量又は減量すること。

#### 効能・効果

便秘。便秘に伴なう次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醸酵、痔。

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。  
他の瀉下薬(下剤)

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師などの専門家に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
はげしい腹痛、恶心・嘔吐

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持つて医師又は薬剤師などの専門家に相談すること。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、恶心・嘔吐


- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師などの専門家に相談すること。

下痢

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。  
(誤用の原因になつたり品質が変わる。)
- (4) 使用期限経過後は服用しないこと。



## センナ分包

第②類医薬品

日本薬局方

# センナ



緩下浸剤