

グリセリン浣腸剤

第2類医薬品

ケンエー浣腸S40

KENEI ENEMA S 40

40g × 10個入

【成分分量】
1個（40g）中
日局 グリセリン 20g含有
添加物：ベンザルコニウム塩化物

【効能効果】
便秘

〈キャップ式〉

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

グリセリン浣腸剤

第2類医薬品

ケンエー浣腸S40

40g × 10個入

S40

開封
年月日

開封時に記入してください

グリセリン浣腸剤

第2類医薬品

ケンエー浣腸S40

40g × 10個入

S40

ケンエー浣腸S40
第2類医薬品

グリセリン浣腸剤

第2類医薬品

ケンエー浣腸S40

40g × 10個入

S40

ケンエー浣腸S40
第2類医薬品

グリセリン浣腸剤 第2類医薬品
ケンエー浣腸S40
40g × 10個入

△ 使用上の注意
❌ してはいけないこと
連用しないでください（常用すると、効果が減弱し（いわゆる“なれ”が生じ）薬剤にたよりがちになります。）
⚠️ 相談すること
1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
(3) 高齢者。
(4) はげしい腹痛、悪心・嘔吐、痔出血のある人。
(5) 心臓病の診断を受けた人。
2. 次の場合は、使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
2～3回使用しても排便がない場合
その他の注意
立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがあります。
【用法用量】
12歳以上 1回1個（40g）を直腸内に注入し、それで効果の
みられない場合にはさらに同量をもう一度注入してください。
＜用法用量に関連する注意＞
(1) 用法用量を厳守してください。
(2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんしてください。
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
(3) 12歳未満の小児には、使用させないでください。
(4) 注入に際し、無理に挿入すると直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
(5) 浣腸にのみ使用してください。

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

【便秘しがちな人のために】
1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。
また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレにいきましょう。
2. 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけましょう。
(例：野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など。)
3. 適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がけましょう。
4. 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。
【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-831 (フリーダイヤル)

グリセリン浣腸剤

第2類医薬品

ケンエー浣腸S40

40g × 10個入

S40

製造番号
使用期限

紙箱