

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

痔核(いぼ痔)・きれ痔・痔出血の症状緩和に

内服痔疾用薬

第②類医薬品

フジパイゾールS錠

製品の特徴

フジパイゾールS錠は、痔疾の改善に効果のある3種の生薬に加え、ビタミンE、センノサイド、止血作用を持つカルバジクロムを配合した服用しやすい糖衣錠です。便通をととのえる・患部を清潔にすることを心がけるとともに、症状の改善に本剤をお役立てください。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人

下痢

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

次の場合の症状の緩和：痔核(いぼ痔)、きれ痔、痔出血

用法・用量

1回下記量を水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人(15才以上)	3錠	3回
11才以上15才未満	2錠	
7 才以上11才未満	1錠	
7 才未満	服用させないでください	

<用法・用量に関する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分とはたらき

成 分	分量(9錠中)	はたらき
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	100mg	血液の循環を良くし、痔疾の改善を促します。
カルバゾクロム	5mg	止血作用があります。
セイヨウトチノミエキスーA	70mg (セイヨウトチノミとして420mg)	抗炎症作用があります。
センノサイド	20mg (センノシドA・Bとして12mg)	大腸のぜん動運動を促進して排便をスムーズにし、痔疾の症状の悪化を防ぎます。
カンゾウ末	240mg	抗炎症作用があります。
トウキ末	720mg	血液の循環を良くし、痔疾の改善を促します。

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、タルク、炭酸Ca、サラシミツロウ、無水ケイ酸、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、アラビアゴム、白糖、酸化チタン、カルナウバロウを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に(ビン包装の場合は密栓して)保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
(分包包装)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) ビンの詰め物は、輸送中の内容物の破損を防ぐためのものです。
開封後は不要となりますので、取りのぞいてください。(ビン包装)

●ワンポイント情報 一痔の治ゆを早めるためにー

痔は、肛門周囲の血流が悪くなり、うっ血や炎症を起こす疾患で、耐えがたく不快な症状があらわれます。お薬とともに、日常生活における養生が大切です。

1. アルコール類、タバコ、コーヒー等の刺激物および暴飲暴食はさけてください。
2. 便秘がちな人は排便時に患部が傷つきやすく、また排便時のいきみはうっ血の原因にもなります。食物などにも注意して便通をととのえることが大切です。
3. 患部を清潔にするように心がけてください。
4. 症状のかるい時は、散歩や体操なども痔の予防や進行をやわらげるのに役立ちます。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36
<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元

国産薬品工業株式会社

岐阜市秋沢370番2