

※※2005年10月改訂（薬事法の改正に伴い改訂しました）

※2004年 1 月改訂（添加物を記載しました）

服用に際しては、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

痔疾舌下療法剤

ヘモリンド[®] 舌下錠

Haemolind[®] Buccal Tablet

【製品の特徴】

- ◆ヘモリンド舌下錠は、痔疾のうち痔核（俗にいういぼ痔）の治療薬で、舌下の粘膜から吸収される薬です。
- ◆ヘモリンド舌下錠の有効成分は、口中粘膜から血管に吸収されて患部に達し、こぶ状にふくらんだ痔静脈の血液循环を改善します。その結果、病変部の炎症はやわらぎ、痛み・出血などの自覚症状も軽快するとともに、痔核そのものも萎縮してきます。



【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎様の症状、 腹部膨満感

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

軟便、下痢

【効能・効果】

内痔核、外痔核の症状の緩解

【用法・用量】

一般症状では1日3回毎回1錠を、急性症状では1日4回毎回2錠、慢性症では第1日に4回毎回2錠、第2日以降1日3回毎回2錠、以後1日3回毎回1錠を空腹時に舌下間で服用して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

かみ砕いたり、のみこんだりしないで下さい（効果が低減します）。舌の下か、歯ぐきと頬の間に入れ、自然にとがして口腔の粘膜から吸収させて下さい。

【成 分】

ヘモリンド舌下錠は1錠中静脈血管叢エキス0.18mgを含む白色の錠剤です。

※添加物としてD-マンニトール、セルロース、白糖、ペプトン、カルメロース、マクロゴール、タルク、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 使用期限(外箱に記載しています)を過ぎた製品は服用しないで下さい。

※※ 本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記にお願い致します。

東菱薬品工業株式会社 学術部

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-10-1

電 話：03-3213-3923

受付時間：午前10：00～午後4：00（土、日、祝日を除く）



※※販 売 元

扶桑薬品工業株式会社 大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

※※製造販売元



東菱薬品工業株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目10番1号