

<生薬配合>痔疾治療内服薬

第②類医薬品

レンシン
RENSHIN

貯法：室温保存

本剤は生薬配合剤で、治療が簡単な内服薬です。痔疾患の諸症状に対応する消炎、止血、鎮痛作用など痔疾患に優れた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 1.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。



相談すること

- 1.次の人は服用前に、医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 今までに薬によるアレルギー症状(例えば発疹、発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人。
- (2) 下痢をしている人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
- (4) 医師の治療を受けている人。

- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤
消 化 器	食欲不振、悪心、嘔吐、下痢

- (2) 1ヵ月以上服用しても、症状の改善がみられない場合

【効能・効果】

痔疾、痔出血

【用法・用量】

大人(15才以上) 1日2回

朝は食前、夜は就寝前 1回に1包を水又は白湯で服用して下さい。

<用法及び用量に関する注意>

- (1) 小児には服用させないで下さい。
- (2) 服用の際は、定められた用法・用量を守って下さい。
又、治療効果をより高めるために次の点にご留意下さい。
- (1) アルコール飲料、タバコ及び強い刺激物は避けて下さい。
- (2) 患部は常に清潔に保つようにして下さい。
- (3) 足、腰、腹部の保温にご留意下さい。
- (4) 繊維質の多い植物性食品を摂取し、規則正しい便通を心がけて下さい。

【成分及び分量】

1日服用量2包中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 有 量
蓮茎	1.5g
カイカ	0.7g
(日局) ショウキョウ	0.3g
(日局) センナ	0.2g

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (3) 包装を破り他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)

【お問い合わせ先】

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

連絡先：レンシン製薬株式会社

電 話 (0776) 67-0453

受付時間 10:00~16:00(土・日・祭日を除く)

【包装】

14包入り(7日分)、28包入り(14日分)、56包入り(28日分)

