

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

痔による痛み・出血・はれ

サブス®坐剤

外用痔疾用薬

リドカイン・塩酸ジブカイン配合

サブス坐剤は、痔による痛み、出血、はれ、かゆみといった不快な症状を改善する外用痔疾用薬です。
2種類の局所麻酔剤、リドカイン・塩酸ジブカインが患部の痛みを鎮めます。

【使用上の注意】

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)患部が化膿している人。

2. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- (2)10日間位使用しても症状がよくなる場合。

【成分】（1個1.5g中）

成分	分量	はたらき
リドカイン	20 mg	患部の痛みを鎮めます。
塩酸ジブカイン	6.67 mg	
酢酸ブレンソロン	1 mg	患部の炎症をおさえ、はれを鎮めます。
塩酸テトラヒドロソリン	1 mg	患部の出血をおさえます。
塩酸クロルヘキシジン	4 mg	殺菌消毒作用があります。
マレイン酸 クロルフェニラミン	4 mg	患部のかゆみをおさえます。
アラントイン	20 mg	傷の治りを早めます。
酢酸トコフェロール (ビタミンE)	60 mg	患部の血液循環を改善します。

添加物としてハードファット、無水ケイ酸を含有します。

【用法・用量】

次の量を肛門内に挿入してください。

年齢	1回量	1日使用回数
15才以上	1個	1～3回
15才未満	使用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉


- (1)小児（15才未満）には使用させないでください。
- (2)本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。
- (3)肛門にのみ使用してください。

【効能・効果】

いぼ痔・きれ痔（さけ痔）の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない30℃以下の涼しい所に保管してください。



※本剤は体温で溶けるように製剤設計しております。温度が上がると坐剤が溶け、変形することがありますので、図のように坐剤の先（とがった方）が下向きになるように箱に入れ、マークのとおり立てて保管してください。

- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) お客様相談室
住所：〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-22-14
電話：03（3986）0613
受付時間：9:00～17:00
（土、日、祝祭日を除く）



製造販売元

全薬工業株式会社

東京都豊島区東池袋3-22-14
営業所 東京都文京区大塚5-6-15
<http://www.zenyaku.co.jp>