

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

痔による痛み・出血・はれ

**サブス坐剤**

外用痔疾用薬

リドカイン・ジブカイン塩酸塩配合

第2類医薬品

**サブス坐剤**は、痔による痛み、出血、はれ、かゆみといった不快な症状を改善する外用痔疾用薬です。  
2種類の異なる局所麻酔剤、リドカイン・ジブカイン塩酸塩がすばやく、持続的に患部の痛みを鎮めます。  
また、ステロイド性抗炎症剤プレドニゾロン酢酸エステルが炎症を抑え、はれを鎮めます。

【使用上の注意】



してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）

1. 次の人は使用しないでください。

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)患部が化膿している人。

2. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| その他  | 刺激感、化膿       |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 |

- (2)10日間位使用しても症状がよくなりません。

## 【成分】（1個1.5g中）

| 成 分                      | 分量      | はたらき               |
|--------------------------|---------|--------------------|
| リドカイン                    | 20 mg   | 患部の痛みを鎮めます。        |
| ジブカイン塩酸塩                 | 6.67 mg |                    |
| プレドニゾン<br>酢酸エステル         | 1 mg    | 患部の炎症をおさえ、はれを鎮めます。 |
| 塩酸テトラヒドロソリン              | 1 mg    | 患部の出血をおさえます。       |
| クロルヘキシジン塩酸塩              | 4 mg    | 殺菌消毒作用があります。       |
| クロルフェニラミン<br>マレイン酸塩      | 4 mg    | 患部のかゆみをおさえます。      |
| アラントイン                   | 20 mg   | 傷の治りを早めます。         |
| トコフェロール酢酸<br>エステル(ビタミンE) | 60 mg   | 患部の血液循環を改善します。     |

添加物としてハードファット、無水ケイ酸を含有します。

## 【用法・用量】

次の量を肛門内に挿入してください。

| 年 齢   | 1回量     | 1日使用回数 |
|-------|---------|--------|
| 15才以上 | 1個      | 1～3回   |
| 15才未満 | 使用しないこと |        |

## ＜用法・用量に関連する注意＞


- (1)小児（15才未満）には使用させないでください。
- (2)本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。
- (3)肛門にのみ使用してください。

## 【効能・効果】

いぼ痔・きれ痔（さけ痔）の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない30℃以下の涼しい所に保管してください。



※本剤は体温で溶けるように製剤設計しております。温度が上がると坐剤が溶け、変形することがありますので、図のように坐剤の先（とがった方）が下向きになるように箱に入れ、マークのとおり立てて保管してください。

- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

## 問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) 全薬工業お客様相談室  
住所：〒112-8650  
東京都文京区大塚5-6-15  
電話：03（3946）3610  
受付時間：9:00～17:00  
（土、日、祝祭日を除く）



製造販売元

**全薬工業株式会社**

東京都豊島区東池袋3-22-14  
営業所 東京都文京区大塚5-6-15  
<http://www.zenyaku.co.jp>