

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

痔の痛み・出血の緩和に

ドルマイン®H坐剤

(ユーカリ油・酢酸ヒドロコルチゾン・塩酸リドカイン配合)
外用痔疾用薬

〔特 徴〕

1. 患部の炎症をおさえる酢酸ヒドロコルチゾン、傷の治りをたすけ組織を修復するアラントインなど7つの成分を配合した坐剤で、痔による代表的な4つの症状、痛み・出血・はれ・かゆみにすぐれた効果を発揮します。
2. 卵黄油、ユーカリ油を配合していますので、傷ついた患部を保護し、使用時に清涼感があります。
3. 挿入しやすい小さめの坐剤で、肛門内側のいぼ痔のはれ・出血等に効果的です。



⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック（アナフィラキシー）	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- (2) 10日間位使用しても症状がよくならない場合

〔効能・効果〕

ざれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

〔用法・用量〕

年 齢	1 回 量	用 法
成人（15才以上）	1 個	肛門内に挿入してください。なお、1日3回まで使用できます。
15才未満	使用しないでください。	

（必ず裏面もお読みください）

〔用法や用量に関する注意〕

- (1) 小児には使用させないでください。
- (2) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。
- (3) 肛門にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法、用量を厳守してください。

ーご使用のアドバイスー

1. 坐剤の取り出し方

- ① ミシン目にそって1個分を切り離します。
- ② 図のように坐剤容器（コンテナ）を剥がし、坐剤を取り出してください。

2. 挿入の仕方

坐剤の後部を指先又はガーゼなどでつまみ、肛門内にできるだけ深く挿入してください。


3. 挿入後の注意

挿入後、激しい運動をすると、坐剤が外にでることもありますので、しばらく激しい運動はさけてください。


4. 坐剤が軟らかい場合

高温下では、坐剤が軟らかくなりやすいので、坐剤容器のまま冷蔵庫に入れるか、清潔な冷たい水の中に入れて冷やし、固まった後に、坐剤容器を剥がしてからご使用ください。

①



②



〔成分〕 1個（1.4g）中

成 分	分 量	は た ら き
塩酸リドカイン	60mg	局所の痛み・かゆみをしずめます。
dl-塩酸メチルエフェドリン	5mg	血管を収縮させ、出血をおさえます。
酢酸ヒドロコルチゾン	5mg	炎症をおさえ、出血・はれ・かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	2mg	患部を殺菌し、傷口の悪化を防ぎます。
アラントイン	20mg	傷の治りをたすけ、組織を修復します。
卵黄油	100mg	患部を保護します。
ユーカリ油	2mg	患部に清涼感を与えます。

添加物として、軽質無水ケイ酸、没食子酸プロピル及びハードファットを含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所（1～30℃）に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 保管する場合は、図のように坐剤の先を下に向けて外箱に入れ、マークに従って立てて保管してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (5) 冷凍庫に入れしないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は品質保持のためになるべく早く使用してください。



お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080（ダイヤルイン）

月～金曜日 9：00～17：00（祝祭日を除く）



発売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11



製造販売元

日新製薬株式会社

山形県天童市大字清池字藤段1331



D05
ドルメインH坐剤
D0690