

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

痔の痛み・出血・はれ・かゆみに

プリザエース軟膏

〈痔疾外用薬〉

- ◆プリザエース軟膏は、酢酸ヒドロコルチゾン、塩酸テトラヒドロゾリン等、痔の治療に効果的な8種類の有効成分が配合されています。これらの成分がはたらいて、痔の症状である痛み・出血・はれ・かゆみに効果をあらわします。
- ◆スーッとする使用感です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります)

① 次の人は使用しないでください

患部が化膿している人。

② 長期連用しないでください



相談すること

**① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談
してください**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

**② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は
薬剤師に相談してください**

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

(2) 10日間位使用しても症状がよくならない場合。



効 能

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和及び消毒

用法・用量

適量を取り、1日1～3回、肛門部に塗布してください。



〈チューブの穴の開け方〉

キャップを逆さにして、突起部をチューブ
の先に強く押し当ててください。

★ご使用前に入浴するか、ぬるま湯で患部を清潔にしてください。また、朝の場合は排便後に、夜の場合は寝る前に使用すると一層効果的です。

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 肛門部にのみ使用してください。

成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

成分

100g中

成分	分量	はたらき
酢酸ヒドロコルチゾン	0.5g	患部の出血・はれをおさえます。
塩酸テトラヒドロソリン	0.05g	
酢酸トコフェロール	3g	血管を強くし、出血を防ぎます。
リドカイン	3g	患部の痛み、かゆみをおさえます。
マレイン酸クロルフェニラミン	0.2g	患部のかゆみをしずめます。
l-メントール	0.2g	
アラントイン	1g	傷口の治りをはやめます。
塩酸クロルヘキシジン	0.25g	細菌の感染をおさえ、傷口の悪化を防ぎます。

添加物：BHT、メチルポリシロキサン、カルボキシビニルポリマー、パルミチン酸デキストリン、合成スクワラン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく
はやく使用してください。(品質保持のため)



治療のポイント



排便後は入浴するか、ぬるま湯で洗う等、肛門を常に清潔にしましょう。また、入浴は患部の血行を改善するので、毎日入るよう心がけましょう。



アルコール類、刺激物(からし、わさび等)を多くとると、症状を悪化させることがあるので、なるべくひかえましょう。



便秘や下痢をしないよう心がけましょう。特に便秘の時には、煮た野菜や海藻類・果物等を多く食べ、便通を整えましょう。



すわり続ける等、同じ姿勢を長く続けると、肛門部がうつ血するため、症状を悪化させやすいので、時々体操や散歩等をして、体を動かしましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

◆本品の詳しい情報や痔に関する
お役立ち情報は

「大正製薬
なるほどネット」へ…
<http://www.taisho.co.jp/119/6029>



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号