

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

痔のかゆみ・はれに

プリザクールジェル

〈痔疾用外用薬〉

- ◆プリザクールジェルは、痔のかゆみ・はれに効果的な塗り薬です。
- ◆べたつかない水性のジェルタイプで、塗ってすぐクールな使用感が実感できます。



使用上の注意



相談すること



① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感


- (2) 10日間位使用しても症状がよくなる場合。

効 能

いぼ痔・きれ痔(さけ痔)のかゆみ・はれ・痛み・出血の緩和及び消毒

用法・用量

適量を取り、1日1～3回、肛門部に塗布してください。



〈チューブの穴の開け方〉

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

★ご使用前に入浴するか、ぬるま湯で患部を清潔にしてください。また、朝の場合は排便後に、夜の場合は寝る前に使用すると一層効果的です。

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 肛門部にのみ使用してください。
- (4) 使用感には個人差があります。皮ふ、粘膜などが敏感な人は、清涼感を強く感じる場合がありますので、少量からお試しください。

成 分

100g中

成 分	分 量	はたらき
マレイン酸クロルフェニラミン	0.2g	患部のかゆみをしずめます。
l-メントール	0.1g	
塩酸リドカイン	3g	患部のかゆみ・痛みをおさえます。
塩酸テトラヒドロソリン	0.05g	患部のはれ・出血をおさえます。
塩化ベンザルコニウム	0.05g	細菌の感染を防ぎ、傷口を殺菌・消毒します。

添加物：カルボキシビニルポリマー、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調節剤、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく
はやく使用してください。(品質保持のため)



治療のポイント



排便後は入浴するか、ぬるま湯で洗う等、肛門を常に清潔にしましょう。また、入浴は患部の血行を改善するので、毎日入るよう心がけましょう。



アルコール類、刺激物(からし、わさび等)を多くとると、症状を悪化させることがあるので、なるべくひかえましょう。



便秘や下痢をしないよう心がけましょう。特に便秘の時には、煮た野菜や海藻類・果物等を多く食べ、便通を整えましょう。



すわり続ける等、同じ姿勢を長く続けると、肛門部がうつ血するため、症状を悪化させやすいので、時々体操や散歩等をして、体を動かしましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いいたします。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

◆本品の詳しい情報や痔に関する

お役立ち情報は



「大正製薬
なるほどネット」へ…

<http://www.taisho.co.jp/119/5975>



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号