



使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

痔の痛み・出血・はれ・かゆみに

ボラギノール[®]A 坐剤

痔 疾 用 外 用 薬

第2類医薬品

特 徴

- 4種の成分がはたらいて、痔による痛み・出血・はれ・かゆみにすぐれた効果を発揮します。
 - プレドニゾン酢酸エステルが出血、はれ、かゆみをおさえ、リドカインが痛み、かゆみをしずめます。
 - アラントインが傷の治りをたすけ組織を修復するとともに、ビタミンE酢酸エステルが血液循環を改善し、痔の症状の緩和をたすけます。
- 効果の発現をよくするため、体温ですみやかに溶ける油脂性基剤を用いて患部に直接作用するよう製剤設計しています。
 - 刺激が少なく挿入しやすい油脂性基剤が傷ついた患部を保護し、スムーズな排便をたすけます。
 - アルミ箔に入った白色～わずかに黄みをおびた白色の坐剤です。

プレドニゾン酢酸エステル
抗炎症作用

+

リドカイン
鎮痛・鎮痒作用

+

アラントイン
組織修復作用

+

ビタミンE酢酸エステル
血液循環改善作用



痔の症状を改善
(痛み・出血・はれ・かゆみに)

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないこと
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)患部が化膿している人。

- 長期連用しないこと



相談すること

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3)本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- (2)10日間位使用しても症状がよくなる場合

効 能

いぼ痔・きれ痔(さけ痔)の 痛み・出血・はれ・かゆみの緩和

用法・用量

被包を除き、次の量を肛門内に挿入すること。

年 齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1個	1～2回
15歳未満	使用しないこと	


(裏面へ続く)

〈用法・用量に関連する注意〉


- (1)本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用すること。
また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用すること。
- (2)肛門にのみ使用すること。
- (3)用法・用量を厳守すること。

坐剤の取り出し方・挿入法


～排便後、入浴後、あるいは寝る前の挿入が効果的です～



アルミシートから1個を切りはなしてください。



両手で左右に開いて坐剤を取り出してください。



坐剤の底を持ち、先の方から坐剤が全部肛門内に入るまで、指で十分に押し込んでください。

挿入後の注意

1. 坐剤が外に出ないように挿入直後の激しい運動はなるべく避けるようにしてください。
2. 挿入後、異物感が残ることがありますが、坐剤が溶けるにしたがってなくなっていきます。
3. 挿入後の排便時に油のようなものが出ることがありますが、これは油脂性基剤の溶けたものですから心配ありません。

成 分


1個(1.75g)中

はたらき	成 分	含 量
炎症をおさえ、出血、はれ、かゆみをしずめます。	プレドニゾン酢酸エステル	1mg
局所の痛み、かゆみをしずめます。	リ ド カ イ ン	60mg
傷の治りをたすけ、組織を修復します。	ア ラ ン ト イ ン	20mg
末梢の血液循環をよくし、うっ血の改善をたすけます。	ビタミンE酢酸エステル (トコフェロール酢酸エステル)	50mg

添加物：ハードファット

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5)本剤はマークに従って1～30℃(1~30℃)で、図のように坐剤の先を下に向け、立てた状態(↑)で保管すること。
- (6)開封後も図のように坐剤を再び外箱に入れて、立てた状態で保管すること。
- (7)冷凍庫など0℃以下の低温で保管した場合、まれに坐剤のひび割れを生じる場合があるので、0℃以下の低温保管はさけること。



外箱の1~30℃↑について

- (1)1~30℃は、保管温度が1～30℃であることをあらわしています。
- (2)↑は、坐剤の先を下に向け、立てた状態で保管することをあらわしています。この向きに保管していただきますと、万一高温で坐剤が溶けたり、軟化した場合でも変形を防ぐことができます。

包 装 10個・20個・30個

痔を予防するためのポイント

～健康な生活サイクルを守り、痔を予防しましょう～

- ①便通をよくするため、1日3食バランスよく食べましょう。



- ②おしりはいつも清潔にしましょう。特に入浴は肛門の血液循環をよくします。



- ③排便のとき、無理にいきまないようにしましょう。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

天藤製薬株式会社「お客様相談係」

〒541-0045 大阪市中央区道修町二丁目3番8号 電話 (06) 6204-2715

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

●ボラギノール.COM(パソコン用)

<http://www.borraginol.com>

●タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用)

<http://tkdm.jp>

製造販売元 **天藤製薬株式会社** 販売元 **武田薬品工業株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町二丁目3番8号 〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号