

この説明文書はお薬とともに保管し、
ご使用の際には必ずお読み下さい。

医薬品

痔疾治療薬

レックH®坐剤

製品の特徴

レックH坐剤は7種類の有効成分の配合により、
痔にともなう痛み・かゆみ・はれ・出血などの症状に
すぐれた効果を発揮します。

！ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないで下さい。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が蒼白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、悪苦しさ等があらわれる。

(2) 10日間位使用しても症状がよくなりない場合

効能・効果

せれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

用法・用量

15才以上：1回1個を肛門内に挿入して下さい。
なお、1日3回まで使用できます。

15才未満の小児には使用させないで下さい。

(使用方法)

- ・使用に際しては、1個ずつ切りはなし右の図のように開いて下さい。
- ・坐剤の先から挿入します。
- ・本剤の使用は排便後にして下さい。

- ・本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用して下さい。
- また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用して下さい。

(坐剤の取り出し方)



○矢印の方向に開いて取り出して下さい。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 肛門にのみ使用して下さい。

成分とはたらき

成 分	分量(1個 (2.15g)中)	はたらき
リドカイン	60mg	坐部の痛み・かゆみをしずめます。
酸化亜鉛	200mg	坐部の炎症をおさえ、保護します。
塩酸クロルヘキシジン	5mg	細菌による感染を防ぎます。
アラントイン	20mg	傷口の治りを早め、痔の症状をしずめます。
グリチルレチン酸	20mg	坐部の炎症をおさえます。
酢酸トコフェロール	20mg	末梢の血行をよくし、坐部のはれ・痛みなどの症状をしずめます。
l-メントール	10mg	坐部に清涼感を与え、かゆみをしずめます。

添加物として、無水ケイ酸、ハードファットを含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、30℃以下のなるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
- (4) 坐剤の先を下に向け、外箱に収納し、立てて保管して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

ワンポイント情報

痔を早く治すために

痔は、肛門周囲の血流が悪くなり、うっ血や炎症を起こす疾患です。お薬とともに、日常生活における養生が大切です。

1. アルコール類、タバコ、コーヒーなどの刺激物は控えましょう。
2. バランスの取れた食事を心がけ、便通を整えましょう。
3. 散歩や体操、入浴などで血行を促しましょう。
4. 患部はいつも清潔にしましょう。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室
東京都千代田区三崎町1-3-12
(03)3293-3363 (ダイヤルイン)
(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し祝祭日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36