

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。



痔疾用剤

痔光軟膏 ホワイト

■外用痔疾用薬 ■販売名：痔光軟膏 ホワイト

痔光軟膏 ホワイトは、炎症をおさえる酢酸ヒドロコルチゾン、グリチルレチン酸をはじめ、鎮痛作用を有するリドカイン、殺菌作用を有するイソプロピルメチルフェノールを配合した白色軟膏で、痔の諸症状を緩和します。

痔光軟膏 ホワイトは油性基剤を使用していますが、水で洗い流すことができます。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

- (2) 10日間位使用しても症状がよくなる場合

■ 効能・効果

され痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

■ 用法・用量

適量を取り、肛門部に塗布する。なお、1日3回まで使用できる。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 肛門部にのみ使用してください。

■ 成分・分量（100g中）

酢酸ヒドロコルチゾン	500mg
リドカイン	3000mg
グリチルレチン酸	1000mg
イソプロピルメチルフェノール	100mg

※添加物として、白色ワセリン、セタノール、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸ポリオキシシル40、セスキオレイン酸ソルビタンを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 軟膏が冷たくなりすぎるとチューブから出なくなる場合があります。
その場合には、暖かい場所に移してしばらくしてから使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。

合名会社 東宝製薬

電話 058-251-6668（代表）

受付時間 10:00～16:00（土・日・祝日を除く）

製造発売元 **合名会社 東宝製薬**
岐阜市徹明通6丁目18番地