

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

痔の痛み・出血・はれ・かゆみに《ヒドロコルチゾン酢酸エステル配合》

新エフレチンK[®]軟膏

第②類医薬品

【痔疾用外用薬】

一般に痔という場合には、いぼ痔（痔核）、きれ痔、軽度の脱肛などを合併していることが多くみられます。

新エフレチンK軟膏はこのような症状を緩和するため、患部へ塗りやすく、使いやすくした軟膏です。炎症や腫れをおさえるヒドロコルチゾン酢酸エステル、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、うっ血をとり、血液の循環を促進するトコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）、痛み、かゆみを止めるジブカイン塩酸塩、そのほか止血、殺菌剤などを配合しています。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください

（1）患部が化膿している人。

2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

（1）医師の治療を受けている人。（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。

（3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血・ただれの緩和及び消毒

用法・用量

適量を取り、肛門部に塗布してください。なお、1日3回まで使用できます。

（裏面につづく）

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を必ず守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 肛門部にのみ使用してください。

【痔の治療のアドバイス】

- 使用の前に入浴、ぬるま湯による患部の洗浄をしますと、一層効果的です。
- 排便時の痛みの激しいとき、排便の前に肛門部に軟膏を塗布しておく、痛みをやわらげ、便が出やすくなります。
- 便秘や下痢は痔に悪影響をおよぼすので、規則正しい排便の習慣をつけるようにしてください。
- 肛門部にうっ血をおこしやすい長時間の立ち続けや座り続けなど、同じ姿勢をしないようにしてください。
- できるだけ安静就床に心がけ、過食をつつしみ、香辛料をさけ、足腰の保温や入浴に努めてください。



成分と働き

100g中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	働き
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g	出血、はれ、かゆみをおさえます。
ジブカイン塩酸塩	0.5g	局所の痛み、かゆみをおさえます。
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	0.5g	血管を収縮させ、出血をおさえます。
クロルヘキシジン塩酸塩	0.5g	細菌の感染を防ぎ、傷口の悪化を防ぎます。
トコフェロール酢酸エステル	3g	血液循環を改善し、痔の症状を緩和します。
アルミニウム・クロルヒド ロキシアラントイネート	1g	出血を防ぎ、傷口のなおりをはやめます。
酸化亜鉛	10g	出血を防ぎ、傷口のなおりをはやめます。

添加物としてゲル化炭化水素を含んでいます。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

お問い合わせ先

本剤のご使用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く)



製造販売元
三宝製薬株式会社

東京都新宿区下落合2-3-18