平成26年8月改訂 勃起不全治療薬

この説明文書は本剤とともに保管し、 服用前に必ずお読み下さい。

神経衰弱性陰萎、老衰性陰萎 衰弱性射精に

# 劇ハンビロン

HANBILON

要指導医薬品

人類史上性交は、大変重要な三大欲望の一つです。しかし、現代のめ まぐるしい生活において、ストレス、食生活、環境等により満足の行く 性生活が失われています。

★ハンビロンは、このような性生活の原因でもある神経性及び老衰性の いわゆるインポテンツや衰弱性射精に効果があります。

ハンビロンは、赤・黄色の不透明の硬カプセルに、灰白色の散剤を充填 したカプセル剤です。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくな ります。)

- 1. 次の人は服用しないで下さい。
  - (1) 心臓及び脳に障害のある人、もしくは病気(例えば心筋梗塞、脳 梗塞、脳出血等) が完治していない人
  - (2) 低血圧症の人
  - (3) 本剤又は本剤の成分により、アレルギー症状を起こしたことがあ る人
  - (4) 重篤な肝機能障害のある人
  - (5) 女性
  - (6) 15歳未満の小児
- 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。 他の勃起不全治療薬



#### 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 高齢者
  - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (4) 薬等によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人
  - (5) 次の症状のある人 排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人

前立腺肥大症、前立腺腫瘍(悪性)、肝臓病、心臓病、腎臓病、高血

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、 直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下 さい

- U 'o										
関係部位				症						
皮	Z		膚	発疹・発赤、かゆみ						
洋	当	化	器	吐き気・嘔吐、食欲不振、嚥下困難、胃部不快感、腹痛						
料	精神神経系			頭痛、めまい、疲労						
7	-	の	他	興奮、不眠、高血圧、ぜんそく、筋肉の硬直、筋痛						

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は、

直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症	状
肝機能障害		黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、 、食欲不振等があらわれる。
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、 白くなり、手足が冷たくな	浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青:り、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- 3. 1ヶ月以上服用しても症状がよくならない場合は、服用を中止し、こ の文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
- 4. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継 続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師 又は薬剤師に相談して下さい。

#### 成分と作用

口のかわき

(2) C 1F/13							
	成 分	1カプセル中	作用				
	塩酸ヨヒンビン	6 mg	勃起中枢を刺激して、外陰部の血管を 拡張し、血液の流入を促進します。				
	硝酸ストリキニーネ	0.5mg	脊髄の反射機能を亢進し、わずかな知覚 刺激でも強度の反射作用を示します。				
	パントテン酸カルシウム	50mg	代謝機能を高めます。				
	反鼻末	153.5mg	和漢薬の強壮強精剤で体全体の機能を高めます。				

添加物として、カプセルにゼラチン、赤色3号、黄色4号(タートラ ジン)、青色1号、酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウム及び亜硫酸水 素ナトリウムを含有します。

#### 効能・効果

神経衰弱性陰萎、老衰性陰萎、衰弱性射精

#### 用法・用量

成人は1日1回1カプセルを水又はぬるま湯で服用して下さい。

#### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量は厳守して下さい。
- (2) 過度の運動時や飲酒時には服用しないで下さい。

#### 養生法

- ○食事はビタミン、ミネラルを多く含んだものや、消化の良いものを摂 り、適度な運動をお薦めします。
- Oストレスを溜めないように、リラックスした生活を心掛けて下さい。
- ○休養が第一です。平常は無理をせず、体力を回復することにより治り を早めます。

# 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が 変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

#### ☆お問い合わせ先

日本薬品株式会社 お客様相談室 〒841-0032 鳥栖市大正町716 電話 0942-82-2029 FAX 0942-82-2036 受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

あかひげ薬局 発売元

製造販売元



**(M)** 日本薬品株式会社