

この説明書は、服用前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

内服用男性ホルモン剤

第1類医薬品

プリズマ[®]ホルモン錠

PRIZMA HORMONE TABLET

男性ホルモンは主に睾丸の間質細胞から分泌されており、先天的に睾丸の発育の悪い人を除けば、加齢と共に睾丸の機能も衰え、その結果、体内の男性ホルモンが不足していきます。

プリズマホルモン錠は男性ホルモンの前駆物質が含まれているブタ睾丸抽出物と、男性ホルモンのメチルテストステロンを主成分に、滋養強壮と胃腸機能を高めることにより滋養強壮効果を向上させる多種類の生薬が配合されており、中高年における男性ホルモンの分泌不足によって起きる男性の性欲減退、陰萎等の症状を改善する医薬品です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないで下さい

- (1) アンドロゲン依存性悪性腫瘍（例えば前立腺癌）及びその疑いのある人
- (2) 肝機能障害のある人
- (3) 女性
- (4) 15歳未満の小児



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
排尿困難
- (4) 次の診断を受けた人
肝臓病、前立腺肥大症、心臓病、腎臓病、糖尿病、高血圧
- (5) 高齢者
- (6) 45歳未満で、精巣機能低下などの疑いがある人（本剤は原則として45歳以上の成人を対象としています）

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	過敏症状

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1～2ヶ月位服用しても症状の改善がみられない場合は、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

【効能・効果】

陰萎、強精、官能性神経症、不感症、夢精、性慾減退症、不眠症

【用法・用量】

大人1回2錠、1日3回を毎食後又は食間に服用して下さい。

(病状により漸次^{だんだん}増量し2倍量^{まで}迄用いても差し支えない)

【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を厳守して下さい。

【症状の解説】

○陰萎（インポテンツ）：勃起力が低下し、性交渉における集中力の減退、又は途中で萎えてしまう症状

○強精：精力を増強させる。

○官能性神経症：性的快感を受ける働きが弱くなる症状

○不感症：性欲が鈍くなって機能の働きが後退してしまう症状

○夢精：中高年における夢精は男性ホルモンが低下することで、性感の正常な機能が得られないという症状

○性慾減退症：ホルモン失調により性欲や性機能の働きが伴わない症状。ストレス等にも関係がある。

○不眠症：中高年以上の方においては、男性ホルモンの分泌不足により眠りが浅いか、又は眠りにくい等の症状によりホルモンの補給を必要とする中高年独特の症状

【成分・分量】（本品1日量6錠中）

有効成分	睾丸抽出物 ……………500mg (固形分として0.5mg)	メチルテストステロン ……………5mg
	橙皮・甘草エキス ……………100mg (固形分として12.5mg)	杜松実エキス ……………100mg (固形分として4.5mg)
	陳皮・当薬・白芷・生姜エキス ……20mg (固形分として1.4mg)	莪朮・大蒜エキス ……………100mg (固形分として11.5mg)
	タラ根・ゲンノショウコエキス ……200mg (固形分として15.0mg)	茴香・丁香・桂皮・牛肝臓エキス ……420mg (固形分として18.9mg)
	ニクズクエキス ……………10mg (固形分として0.2mg)	
添加物	アラビアゴム末、アルギン酸ナトリウム、カルナウバロウ、カルメロースカルシウム、結晶セルロース、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、精製セラック、精製白糖、ゼラチン、タルク、沈降炭酸カルシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース	

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本品に関するお問い合わせは、お買求めのお店又は下記にお願い申し上げます
原沢製薬工業株式会社 お客様相談室
電話：(03)3441-5191
受付時間：9:30～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売 

原沢製薬工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番17号