

男性ホルモン内服剤

劇 マヤ金蛇精 (カプセル) 要指導医薬品

☆マヤ金蛇精(カプセル)は、男性の更年期に不足してくる男性ホルモンであるメチルテストステロン、局所血流量を増加させるヨヒンビン塩酸塩、ストリキニーネ硝酸塩を中心に、強壮生薬のニンジン、赤何首烏末、イカリ草末、そして動物性のマムシ(五八霜末)及びビタミン(ビタミンB₁やビタミンC)を配合し、男性の性機能の衰えに働きかけ効果をあらわします。

使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) アンドロゲン依存性腫瘍(例えば前立腺癌)及びその疑いのある人
(腫瘍の悪化をうながすことがあります。)
- (2) 肝機能障害のある人
(症状が増悪することがあります。)
- (3) 女性
- (4) 15歳未満の小児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 高齢者(アンドロゲン依存性腫瘍が潜在化している可能性があるため)
- * (3) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
排尿困難
- (5) 次の診断を受けた人
前立腺肥大症、前立腺腫瘍(悪性)、肝臓病、心臓病、腎臓病、高血圧



* 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|----------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛 |
| * 其 他 | 興奮、不眠、高血圧 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------|---|
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

* 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

□ のかわき、軟便、下痢

効能・効果

神経衰弱性陰萎、老衰性陰萎、衰弱性射精

用法・用量

通常1回2カプセル、1日2回、水又はお湯で服用してください。
なお、症状により倍量から半量まで増減することもできます。

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)PTPシート品のカプセル剤取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量

2カプセル(1回量)中に次の成分を含有しています。

| 成分 | 分量 | 成分 | 分量 |
|-----------------|---------|----------------|---------|
| ヨヒンビン塩酸塩 | 9.95mg | アスコルビン酸(ビタミンC) | 50.0mg |
| ストリキニーネ硝酸塩 | 0.05mg | タウリン | 100.0mg |
| メチルテストステロン | 5.0mg | 五八霜末 | 200.0mg |
| ニンジン | 100.0mg | イカリ草末 | 100.0mg |
| チアミン硝酸塩(ビタミンB1) | 5.0mg | 赤何首烏末 | 100.0mg |

添加物として乳糖水和物、ゼラチン、黄色4号(タートラジン)、黄色5号、ラウリル硫酸Naを含有します。

<成分・分量に関連する注意>

ビタミンCを含有する製剤は、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。従って、医師の検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

ピン入り品、PTPシート品について

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (3)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



ピン入り品について

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)ピンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をめれた手で扱わないでください。
- (3)ピンの中の詰め物は、輸送中にカプセル剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (4)箱とピンの「開封年月日」記入欄に、ピンを開封した日付を記入してください。

PTPシート品について

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)PTPシートを切り離すときは、変質の原因となりますので、服用しない本剤の裏面のアルミ箔に傷をつけないようにしてください。また、切り離したPTPシートの角で、手指などを傷つけないようご注意ください。

お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

摩耶堂製薬株式会社 「くすりの相談室」

〒651-2142 神戸市西区二ツ屋1-2-15 電話 (078)929-0112

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)



製造販売元

摩耶堂製薬株式会社

神戸市西区玉津町居住65-1