

この添付文書は、本剤をご使用になる前に必ずお読みください。
また、必要なときにいつでも読めるよう保管しておいてください。

生薬煎剤の利尿薬

第2類医薬品

桔梗智辨 水気下し

ききょうちべん すいけくだし

桔梗智辨 水氣下しは、利尿作用のあるナンバンゲ・バショウコン・シュロジツ、尿路の殺菌・利尿作用のあるウワウルシ、消炎・利尿作用のあるカゴソウ、消炎・鎮痛・利尿作用のあるセッコツボク・モクツウ、鎮静・利尿作用のあるブクリヨウ、急な痛みを和らげる作用のあるカンゾウ、計9種の和漢生薬を配合した生薬の煎じ薬です。

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 次の症状のある人：むくみ
 - (5) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

(2) 1カ月ぐらい服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

利尿剤として下記に用いる。

腎臓病、膀胱カタル、尿道炎、脚気

(カタルとは、粘膜が刺激されて炎症を起こすことをいいます。)

■ 用法・用量

成人(16歳以上)は、1包に水500mLを加え、半量に煎じつけ、その煎液を1日3回に分け、食前に温めて服用してください。8~15歳は成人の1/2量、5~7歳は成人の1/3量、3~4歳は成人の1/6量あて、いずれも1日3回に分け、食前に温めて服用してください。

3歳未満の乳幼児には、服用させないでください。

(食前とは、食事のおよそ30分前をいいます。)

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

<煎じ方>

生薬を紙袋に入ったままの状態で容器に入れ、水を加えて、とろ火で煎じつめてください。

注意 1. 中の紙袋は、そのまま煎じられるよう特殊な紙を使用しています。

紙袋を破って中の生薬を、直接、容器に入れることは避けてください。

2. 容器は土製、陶製のものがよく、鉄製のものは避けてください。

3. 加熱はとろ火で行い、急速に煮沸させるのは避けてください。

4. 煎じつけた後は、熱いうちに、紙袋を引き上げてください。

■ 成分・分量：1包(24g) 中

ナンバンゲ(南蛮毛)	2 g	セッコツボク(接骨木)	3 g
ウワウルシ	3 g	ブクリヨウ(茯苓)	3 g
バショウコン(芭蕉根)	3 g	モクツウ(木通)	3 g
シュロジツ(棕櫚実)	3 g	カンゾウ(甘草)	2 g
カゴソウ(夏枯草)	2 g		

■ 保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

■ 問い合わせ先

チベン製薬株式会社 〒567-0073 大阪府茨木市西穂積町3番8号
電話：072-622-2509 FAX：072-625-6320