

# J A C K O E C A P S U L E

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## 第3類医薬品

ビタミンE主薬製剤

# 若 魁 E カプセル

若魁Eカプセルは、生理活性(効力)が高い天然ビタミンEと薬用人参をソフトカプセルに充填した医薬品です。若魁Eカプセルは、天然ビタミンEと薬用人参の働きにより末梢血行障害や更年期における「肩・首すじのこり」や「手足のしびれ・冷え、のぼせ」などの症状を効果的に改善します。



### 使用上の注意



#### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器  | 胃部不快感     |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、下痢
4. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります  
出血が長く続く場合は、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

- 更年期における次の諸症状の緩和  
肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
  - 末梢血行障害による次の諸症状の緩和  
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
  - 月経不順
- 「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください」
- 次の場合のビタミンEの補給  
老年期

## 用法・用量

次の量を毎食後に服用してください

| 年齢        | 1回服用量   | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15才以上) | 1カプセル   | 3回     |
| 15才未満     | 服用しないこと |        |

&lt;用法・用量に関連する注意&gt;

(1) 定められた用法・用量を厳守してください

(2) カプセルの取り出し方 PTP包装の場合は、図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面アルミ箔を破り、取り出して服用してください(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります)



なぜ、若**錠Eカプセル**は食後の服用が効果的なのですか？

ビタミンEは油に溶ける**脂溶性ビタミン**で胆汁酸などの働きをかりて吸収されるために、胆汁酸が分泌している食後に服用するのが効果的です

## 成分・分量

成人1日量(3カプセル)中に次の成分を含んでいます

| 成分                                | 含量                        | はたらき  |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| d- $\alpha$ -トコフェロール<br>(天然ビタミンE) | 300mg                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ホルモンを分泌する器官の働きを助けて分泌を調整し、更年期による冷え、肩こりを改善します</li> <li>2. ビタミンEは、脂肪の酸化を防ぎますので、過酸化脂質が増加しやすい老年期には、特に補給が大切です</li> <li>3. 全身の血液の流れをよくします</li> </ol> |
| ニンジン乾燥エキス                         | 60mg<br>(原生薬として<br>600mg) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 血液の流れをよくして、女性ホルモンの分泌を促します</li> <li>2. 過酸化脂質の増加を抑制します</li> </ol>   |

添加物として、ダイズ油、硬化油、カプセルにコハク化ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール、ポリソルベート80、三酸化鉄を含有しています

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください(瓶入りの場合は密栓して保管してください)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください

## 本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室  
住所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16  
電話：(03) 3370-7174 (代表)  
受付時間：午前9：00から午後5：00まで  
(土、日、祝日を除く)

発売元

 日邦薬品工業株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元

 日東薬品工業株式会社  
京都府向日市上植野町南開35-3