

〔使用上の注意〕 **相談すること**

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

〔効 能〕

○次の諸症状の緩和：

神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労

○脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。」

○次の場合のビタミンB₁の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

〔用法・用量〕

成人（15才以上）1回1瓶（50mL）を1日1～2回服用して下さい。

1日2回服用する場合は、服用間隔を4時間以上おいて下さい。

○用法・用量を厳守して下さい。

○小児には服用させないで下さい。

〔保管及び取扱い上の注意〕

（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。

（2）小児の手の届かない所に保管して下さい。

（3）他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）


（4）使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。

ガラス：瓶、金属：キャップ

肩こり・神経痛・眼精疲労に

アインゴールド[®]内服液

**コンドロイチン硫酸ナトリウム
ビタミンB₁・B₂・B₆配合**



製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地
本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町40番6号
お客様相談室 電話 058-278-3933

〔成分・分量〕50mL中

コンドロイチン硫酸ナトリウム …450mg

硝酸チアミン ……………10mg

リン酸リボフラビンナトリウム …7.5mg

塩酸ピリドキシン ……………25mg

ニコチン酸アミド ……………30mg

（アルコール 0.2mL以下）

添加物：カラメル、
エタノール、白糖、
D-ソルビトール、
クエン酸、安息香
酸Na、バラベン、
香料

○本剤に配合されているリン酸リボフラビンナトリウムにより、尿が黄色くなることがあります。



使用期限

製造番号