

〔使用上の注意〕 **相談すること**

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

〔効能〕

○次の諸症状の緩和:

神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労

○脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。」

○次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給:

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

〔用法・用量〕

成人(15才以上) 1回1瓶(50mL)を1日1~2回服用して下さい。

1日2回服用する場合は、服用間隔を4時間以上おいて下さい。

○用法・用量を厳守して下さい。

○小児には服用させないで下さい。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。

副作用被害救済制度


☎0120-149-931

ガラス：瓶、金属：キャップ

# 肩こり・神経痛・眼精疲労に

## アインゴールド<sup>®</sup>内服液

コンドロイチン硫酸ナトリウム  
ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>配合



50mL

第3類  
医薬品

製造販売元 小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中朝1丁目139番地  
本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町40番6号  
お客様相談室 電話 058-278-3933

〔成分・分量〕50mL中

コンドロイチン硫酸ナトリウム…450mg

硝酸チアミン……………10mg

リン酸リボフラビンナトリウム…7.5mg

塩酸ピリドキシン……………25mg

ニコチン酸アミド……………30mg

(アルコール 0.2mL以下)

添加物:カラメル、  
エタノール、白糖、  
D-ソルビトール、  
クエン酸、安息香  
酸Na、パラベン、  
香料

○本剤に配合され  
ているリン酸リボ  
フラビンナトリウ  
ムにより、尿が黄  
色になることがあ  
ります。



4

使用期限

製造番号