

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保存して下さい。

ビタミンB₁
主 薬 製 剤

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム900mg配合

ウエルボン・B錠

特徴

ウエルボン・B錠は、腰痛、肩こり、五十肩等の症状を緩和するコンドロイチン硫酸エステルナトリウム、チアミンジスルフィド及びオキソアミジン末を配合した白色の錠剤で、お子様からご年配の方まで服用して頂けます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振
その他	手足・まぶたのはれ

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

【効能・効果】

○次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労、便秘

○脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。」

○次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人(15才以上)	3 錠	朝夕 2 回
11才以上15才未満	2 錠	
7 才以上11才未満	1 錠	
7 才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(裏面につづく)

〔成分・分量〕

1 日量（6 錠）中

成 分	含 量	は た ら き
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム (コンドロイチン硫酸ナトリウム)	900mg	関節軟骨内に存在し、弾力性や保水性を与える作用があります。
チアミンジスルフィド (ビタミンB ₁ 誘導体)	20mg	関節痛や神経痛等の症状を持続的に緩和します。
オキソアミジン末	30mg	にんにくから抽出・精製した無臭性の有効成分で、ビタミンB ₁ の吸収率を高めます。

添加物として乳糖水和物、ポビドン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、カルメロースCa、エチルセルロース、マクロゴールを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

天然物由来の成分を用いた製剤ですから、製品により錠剤の色調が多少異なることがありますが、効果にはかわりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 本剤を服用する場合は、湿った手・ぬれた手で取扱わないこと。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (4) 品質を保持するために、服用の都度キャップをしっかりとしめること。
- (5) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後は品質を保持するため用法・用量を守りなるべく早く服用すること。



直射日光

－日常の心がけ（肩こりの場合）－

適度な運動(体操等)をしましょう。



入浴（保温）、マッサージでリラックスしましょう。



休養・睡眠をとり、過労は避けましょう。



栄養のバランスに気をつけましょう。



お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：03(3370)7174(代表)

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 牛津製薬株式会社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2