

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

ビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤

# クミアイビタレオンVE

クミアイビタレオンVEは、1日量1錠中に神経・筋肉系に作用するビタミンB<sub>1</sub>を100mg配合しました。

クミアイビタレオンVEは、吸収、体内利用の良いビタミンB<sub>1</sub>誘導体(フルスルチアミン)を使用し、肩こり、便秘、眼精疲労、神経痛、筋肉痛の緩和に、肉体疲労時や老年期のビタミンB<sub>1</sub>の補給に、また脚気に効果があります。

ビタミンB<sub>1</sub>の他、ビタミンE、B<sub>2</sub>、B<sub>6</sub>、B<sub>12</sub>、 $\gamma$ -オリザノールを配合しています。

## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労  
脚 気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」  
次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

裏面もお読みください。

## 用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人(15歳以上)	1 錠	1 回
15歳未満	服用しないでください	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

## 成分・分量

1錠(大人の1日服用量)中

成 分	含 量
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体) (フルスルチアミンとして)	109mg 100mg)
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	15mg
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	12mg
γ-オリザノール	10mg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム (ビタミンEコハク酸エステルカルシウム)	30mg
シアノコバラミン(ビタミンB <sub>12</sub> )	0.06mg

添加物：黄色4号(タートラジン)、部分アルファー化デンプン、トウモロコシデンプン、セルロース、CMC-Ca、クロスポビドン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、ステアリン酸、マクロゴール、白糖、炭酸Ca、タルク、アラビアゴム、ゼラチン、カルナウバロウ

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがあります。これは本剤に含まれるビタミンB<sub>2</sub>(リボフラビン)によるものです。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## お問い合わせ先

- (1) 本製品の購入先(北海道厚生農業協同組合連合会)
- (2) 佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室  
TEL 0744-28-0021  
受付時間 9:00~16:30(土・日・祝日を除く)

発 売 元



北海道厚生農業協同組合連合会  
札幌市中央区北4条西1-1

製造販売元



佐藤薬品工業株式会社  
奈良県橿原市観音寺町9番地の2