

販売名 ビルトンゴールド

服用に際しては、このラベルをお読みください。

△【使用上の注意】 ■【相談すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気、嘔吐

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢 3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 ●次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛、関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 ●錠剤【ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。】 ●次の場合のビタミンB₁の補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】成人（15歳以上）1回1本（50mL）を1日2回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

お客様相談室 電話 0535-21-3200
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

■神経痛・手足のしびれ・便秘・眼精疲労の緩和
■肉体的疲労時のビタミンB₁の補給

ビルトンゴールド

BILTON GOLD

第3類
医薬品

ペンフォチアミン
配合

肩こり
腰痛
眼精疲労
肩腰眼

50mL



製造販売元
中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

【成分・分量】1日量100mL（50mL×2本）中
ペンフォチアミン38mg、
オキソアミチン末（加工大豆）200mg、リソフランピリン酸エステルナトリウム15mg、ピリドキシン塩酸塩50mg、ニコチン酸アミド60mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム400mg
添加物：エトヘ酸Ca/Na、白糖、果糖、D-ソルビトール、ムネトール、クエン酸、d-リンゴ酸、パラベン、塩酸、エタノール、プロピレングリコール、香料

【保管及び取り扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になりたり品質が変わる。）。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで。本剤は生薬成分を配合していますので、沈澱を生じることがあります。よく振ってから服用してください。ガラス：ピン 金属：キャップ

03BGELCH

製造番号

使用期限

