

販売名 パッションードリンク

【成分・分量】1本(50mL)中
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)
30mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)50mg、
ニコチン酸アミド60mg、チアミン硝化物(ビタミンB₁)10mg、ヨクイニンエキス150mg(ヨクイニンとして1950mgに相当する)添加物としてクエン酸、dL-リンゴ酸、果糖、ブドウ糖、バラベン、プロピレングリコール、エタノール、香料を含有する。

【効能・効果】◎次の諸症状の緩和:肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、皮膚炎、湿疹、かぶれ、ただれ、目の充血、目のかゆみ、赤鼻「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

◎次の場合のビタミンB₂の補給:肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】成人(15歳以上)1回1本(50mL)を1日1回服用してください。(15歳未満は服用しないこと)●用法・用量を厳守すること。

発売元 **奥田製薬株式会社**
大阪市北区天満1丁目4番5号

お薬相談 06-6351-2100
(9:00~17:00 土日祝日を除く)

製造販売元 **中外医薬生産株式会社**
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

ガラス:ビン
金属:キャップ

05

50mL

第3類医薬品



生薬
ヨクイニン
配合

パッションードリンク

肌あれ、にきび、口内炎

ビタミン
B₂B₆
配合
ドリンク

〈使用上の注意〉

相談すること

1. 次の場合は直ちに服用を中止し、この製品を持って医師または薬剤師に相談すること。

(1) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合。

〈保管及び取扱い上の注意〉(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小

児の手のとどかない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

製造番号

使用期限

