販売名 ラヴァーレドリンク

【成分・分量】 1本（50mL）中 リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB_2リン酸エステル)30mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB_6)50mg、ニコチン酸アミド60mg、チアミン硝化物(ビタミンB_1硝酸塩)10mg、ヨクイニンエキス150mg（ヨクイニンとして1950mg）添加物としてクエン酸、dl-リンゴ酸、果糖、ブドウ糖、パラベン、プロピレングリコール、エタノール、香料を含有する。

【効能・効果】 ○次の諸症状の緩和 肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、皮膚炎、湿疹、かぶれ、ただれ、目の充血、目のかゆみ、赤鼻「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」 ○次の場合のビタミンB_2の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】 成人（15歳以上）1回1本（50mL）を1日1回服用してください。（15歳未満は服用しないこと。）●用法・用量を厳守すること。

＊本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

発売元 奥田製薬株式会社
大阪市北区天満1丁目4番5号
お薬相談 06-6351-2100（代表）
（9:00～17:00 土日祝日を除く）
製造販売元 中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

ガラス：ビン　金属：キャップ

06　副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

肌あれ・にきび・口内炎

B2 B6

ビタミンB2　ビタミンB6　ヨクイニン　配合

ラヴァーレドリンク

第3類医薬品　50mL

〈使用上の注意〉

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。○皮膚：発疹・発赤、かゆみ ○消化器：胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。○下痢 3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

〈保管及び取扱い上の注意〉（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。（2）小児の手の届かない所に保管すること。（3）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）（4）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

＊本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB_2リン酸エステルによるものですので心配ありません。

製造番号

使用期限

4 987037 801038