

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

アスコルビン酸錠 500 イワキ

ビタミン C（アスコルビン酸）は、生理的に重要な働きをするビタミンのひとつです。
近年その薬理作用が解明されるにつれ体の中で重要な役割を果たしていることがわかつてきました。
体内では作ることができないため、食品（野菜、果物等）や医薬品から摂る必要があります。
食品から摂る場合、ビタミン C は調理法や保存法によっては壊れ易く、又季節や産地による含有量の変動が認められます。

特徴

☆1錠中500mgの高単位のビタミンCを含有します。

☆分割線入りですので、割って服用できます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合

2. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

効能・効果

1. 次の諸症状の緩和

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

2. 次の場合の出血予防

歯ぐきからの出血、鼻出血

上記の症状について、1カ月ほど服用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。

3. 次の場合のビタミンCの補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量

1日2回朝・夕の食後に口の中でとかさずに、そのまま水かお湯などでおのみください。

年 齢	1回量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	2錠	2回
小児(7歳以上15歳未満)	1錠	2回
7歳未満の乳幼児	服用しないこと	

〈用法及び用量に関する注意〉

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- のみにくい場合は、割線がついていますので割ってお飲みください。

成分・分量	成 分
	4錠（1日量）中、アスコルビン酸（ビタミンC）2000mg含有
	添加物 カルボキシメチルセルロース、トウモロコシデンプン、セルロース、 ビタミンB₂、ステアリン酸Mg
	性 状 だ円形、分割線のある白色の錠剤

〈成分・分量に関する注意〉

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。これらの検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお話しください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 錠剤に水分が付着すると表面が変色しますので、ぬれた手で触れないでください。
- 容器の詰め物は、運送中の錠剤破損防止用です。開封後は捨ててください。
(本剤はだ円形の錠剤のため、落下等の衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いには十分ご注意ください。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても速やかに服用してください。使用期限は容器及び外箱に表示しております。



包 装 250錠

こんなときにビタミンCを



◎本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

岩城製薬株式会社 電話 (03) 3241-3201 受付時間 平日 9:00~17:00

製造販売



岩城製薬株式会社

東京都中央区日本橋本町4-8-2



C50404