

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤

キョービタ・C[®]顆粒

®登録商標

ビタミンC（アスコルビン酸）は、重要な生理作用をもったビタミンの一つで、体内ではつくることが出来ないため、医薬品や食物から摂取する必要があります。

キョービタ・C顆粒は、ビタミンCとその作用を助け脂質代謝に関与するパントテン酸カルシウムを配合した製剤です。またビタミンCの酸味をやわらげ、口の中でまるやかに溶ける服用しやすい顆粒剤で、1包で500mgのビタミンCが補給できます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

- 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

<効能・効果>

次の諸症状の緩和

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着。

次の場合の出血予防

歯ぐきからの出血、鼻出血。



「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」

次の場合のビタミンCの補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期。

<用法・用量>

次の1回量を1日3回空腹時をさげ、服用してください。

	15才以上	11~15才未満	7~11才未満	3~7才未満	1~3才未満	1才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包	服用しないこと
						×

用法・用量に関する注意

- ① 定められた用法、用量を厳守してください。
- ② 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- ③ 1才未満の乳児には服用させないでください。

<成分・分量>

1日量（1包2g×3包）中

成分	分量	はたらき
アスコルビン酸(ビタミンC)	900mg	お肌や粘膜などの細胞組織を正常に保つ コラーゲンの生成を助け、皮ふをすこやかに保ちます。
アスコルビン酸ナトリウム (アスコルビン酸として600mg)	675mg	
パントテン酸カルシウム	30mg	ビタミンCの働きを助け、しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着の緩和に効果をあらわします。

添加物：白糖、ブドウ糖、乳糖、サッカリンNa、ポビドン、黄色4号（タートラジン）、香料、トコフェロール

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
4. 1包を分割し、残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
5. 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。
大昭製薬株式会社 おくすり相談室
電話 0748-88-4181
受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

 **大昭製薬株式会社**
DAISHO 〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168