



クミアイ

ビタミンC錠「チュアブル」

ビタミンC剤

特 徴

- クミアイ ビタミンC錠「チュアブル」は、12錠中にビタミンCを2000mg含む、甘酸っぱいオレンジ味の服用しやすい医薬品のビタミンC剤です。
- 日やけ・かぶれなどによる色素沈着や、しみ、そばかすが気になる時、メラニン色素に働いて、色素の沈着を緩和します。特に更年期や妊娠中などは、ホルモンバランスにより、しみがあらわれやすくなりますから、ビタミンCの積極的な服用が効果的です。
- ビタミンCは、細胞と細胞をつなぐコラーゲンの生成に必要とされ、毛細血管を丈夫にして、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。
- 糖類が含まれていませんので、カロリーも12錠で3.7キロカロリーと控えめです。
- 3歳のお子様から服用いただけます。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
次の診断を受けた人
フェニルケトン尿症
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	悪心・嘔吐

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

効能・効果

- 次の諸症状の緩和
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防
歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください」
- 次の場合のビタミンCの補給
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量

次の量を、かみくだくか、又は口の中で溶かして服用してください。

年 齢	1 回量	1 日の服用回数
15歳以上	2錠～4錠	3 回
7 歳～14歳	2 錠	
3 歳～6 歳	1 錠	
3 歳未満	服用しないこと	

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 3 歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分・分量

12錠中

成 分	分 量
ビタミンCとして	2,000mg
〔アスコルビン酸(ビタミンC) アスコルビン酸ナトリウム(ビタミンCのナトリウム塩)〕	1,300mg 787.35mg
酪酸リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg

添加物として、トウモロコシデンブン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、還元麦芽糖水アメ、D-マンニトール、ステアリン酸Mg、香料を含有する。

成分・分量に関連する注意

- (1) 酪酸リボフラビン(ビタミンB₂)により尿が黄色くなることがありますが、心配はありません。
- (2) 本剤は、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、尿及び大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 服用のつどキャップをよくしめてください。
- (5) ビンの中の詰め物は、キャップをあけた後は捨ててください。(詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものです。)
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口

電話：0238-46-2013

[月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)]

販 売 者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町一丁目8番3号

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930