



A-coop クミアイ

ビタミンC錠「チュアブル」

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤

特 徴

- 12錠中にビタミンCを2,000mg含む、甘酸っぱい味の服用しやすい医薬品のビタミンC主薬製剤です。
- 日やけ・かぶれなどによる色素沈着や、しみ、そばかすが気になる時、メラニン色素に働いて、色素の沈着を緩和します。特に更年期や妊娠中などは、ホルモンバランスにより、しみがあらわれやすくなりますから、ビタミンCの積極的な服用が効果的です。
- ビタミンCは、細胞と細胞をつなぐコラーゲンの生成に必要とされ、毛細血管を丈夫にして、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。
- 3歳のお子様から服用いただけます。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
次の診断を受けた人：フェニルケトン尿症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関 係 部 位	症 状
消 化 器	吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

○次の諸症状の緩和：

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防：

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」

○次の場合のビタミンCの補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量

次の量を、かみくだくか、又は口の中で溶かして服用してください。

年 齢	1 回 量	服用回数
15歳以上	2錠～4錠 	1 日3回
7歳～14歳	2錠 	
3歳～6歳	1錠 	
3歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分・分量 1 日量(12錠)中

成 分	含 量	は た ら き
ビタミンCとして	2,000mg	○皮膚のメラニン色素に働いて、しみ、そばかす、日やけなどを防ぎます。 ○細胞と細胞をつなぐコラーゲンの生成に不可欠で、血管を丈夫にし、歯ぐきからの出血や鼻出血を防ぎます。 ○ビタミンC欠乏症を予防します。
アスコルビン酸(ビタミンC)	1,300mg	
アスコルビン酸ナトリウム (ビタミンCのナトリウム塩)	787.35mg	
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂)	12mg	肌を健康に保つ作用があります。

添加物として、トウモロコシデンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、還元麦芽糖水アメ、D-ソルビトール、ステアリン酸Mg、香料を含有する。

<成分・分量に関連する注意>

- (1)リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂)により尿が黄色くなることがありますが、心配はありません。
- (2)本剤は、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、尿及び大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)服用のつどキャップをよくしめてください。
- (5)ビンの中の詰め物は、キャップをあげた後は捨ててください。(詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものです。)
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口 ☎ 0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)

販 売 者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町1-3-1

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930