

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



ハイシー[®]1000

ビタミンC製剤

第3類医薬品

特徴

- ビタミンCが、しみ・そばかす、日焼けなどによる色素沈着を緩和します。皮膚に関連するビタミンB₂も配合しています。
- ビタミンC 1,000mgが1包で補給できます。
- サツと溶け、ほのかな甘みと酸味で、のみやすい黄色の微粒状の散剤(細粒)です。
- カロリーは2包(1日最大服用量)で約7kcalです。



⚠️ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

次の診断を受けた人。
フェニルケトン尿症

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師または薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること

下痢

効能

1. 次の諸症状の緩和
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
2. 次の場合の出血予防
歯ぐきからの出血、鼻出血
3. 次の場合のビタミンCの補給
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

「ただし、上記1および2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師に相談すること。」

用法・用量

次の量を、食後に服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	1～2回
15歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守すること。



成分 2包(4g、1日最大服用量)中

成分	含量
ビタミンCとして	2,000mg
〔アスコルビン酸(ビタミンC) L-アスコルビン酸ナトリウム	1,000mg 1,124.79mg〕
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	12mg


添加物：トウモロコシデンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、白糖

<成分に関連する注意>

- (1)尿および大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師に知らせること(尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがある)。
- (2)本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン酪酸エステルによるものなので心配ありません。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



マメ知識

ビタミンCについて

- 皮膚のメラニンに働いて、しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着の緩和に効果をあらわします。
- 細胞と細胞をつなぎ、肌のしなやかさを保つのに役立つコラーゲンの生成に必要で、血管壁を丈夫にし、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。

包装 24包(2g×24)、48包(2g×48)、84包(2g×84)

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

- タケダ健康サイト(パソコン用) <http://takeda-kenko.jp>
- タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

製造販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号