



0.6g × 60包

ビタミンC剤

ビタミンC 「ケンイー」

日本薬局方 アスコルビン酸

原末

ビタミンC「ケンエー」

日本標準商品分類番号 87314

【成分・分量】

本品 1包 (0.6g)中 日局 アスコルビン酸 0.6g 含有。

【効能・効果】

○次の諸症状の緩和：

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防：

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

○次の場合のビタミンCの補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

15歳以上・・・・・・・・・・1回1包

11歳以上15歳未満・・・・・・・・1回2/3包

7歳以上11歳未満・・・・・・・・1回1/2包

3歳以上 7歳未満・・・・・・・・1回1/3包

1歳以上 3歳未満・・・・・・・・1回1/4包

いずれも1日2～3回食後に服用してください。



【使用上の注意】

1. 服用に際して、次のことに注意してください

(1)定められた用法、用量を守ってください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)本剤は、1歳未満の乳児には服用させないでください。

2. 服用中又は服用後は、次のことに注意してください

(1)本剤の服用により、悪心・嘔吐、下痢等の症状があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

(2)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

(3)1カ月位服用しても症状の改善がみられない場合には、医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

製造番号

使用期限

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう商品と共に大切に保管してください。

3. 保管及び取扱い上の注意

(1)小児の手のとどかない所に保管してください。

(2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。

(4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

(5)使用期限が過ぎたものは服用しないでください。



製造発売元

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号