

ご使用に際して、この説明文書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第3類医薬品

ビタミンC 製剤 ビタミンCシライシ

次のようなかたに特におすすしします。シミ・ソバカスの気になる方、肉体疲労時・病氣中や病氣後の体力低下時、妊娠・授乳期、老年期などビタミンCが不足しがちなとき、日やけ・かぶれによる色素沈着（メラニン色素が沈着すること）、歯ぐきからの出血や鼻出血。

特にビタミンCは体内で合成できないため、毎日の補給が必要で、服用には医薬品のビタミンCをお薦めいたします。



使用上の注意



相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消 化 器	吐き気・嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください




【効能・効果】

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、
病中病後の体力低下時、老年期



【用法・用量】

次の量を朝夕食後に服用する。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
5歳以上大人まで	3 錠	2 回
5歳未満	服用しないでください	

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】


1日量（6錠）中

成 分	含 量
ビタミンC（アスコルビン酸）として	500 mg
〔アスコルビン酸……………250 mg〕 〔L-アスコルビン酸ナトリウム……………281.2mg〕 （アスコルビン酸として250mg）	

添加物として白糖、セルロース、マクロゴール、タルク、香料、プロピレングリコール、乳糖水和物及び黄色4号（タートラジン）を含有する

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
- ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。



【問い合わせ先】

寧薬化学工業株式会社

〒635-0035：奈良県大和高田市旭南町2-25

電 話：0745-22-4151

受付時間：9:00～16:00（土・日・祝日を除く）

発 売 元 白 石 薬 品 株 式 会 社

大阪府茨木市五日市1丁目10番33号

製造販売元 寧薬化学工業株式会社

奈良県大和高田市旭南町2-25