

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保存して下さい。

ビタミンC
主薬製剤

ビタミンC、ビタミンB₂、ビタミンB₆配合

ビボーン・C

特徴

ビボーン・Cは、ビタミンCにビタミンB₂、パントテン酸カルシウム、ビタミンB₆を配合した黄色の顆粒剤で、乳幼小児（1才以上）からご年配の方まで服用して頂けます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

（1）服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐

（2）1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

〔効能・効果〕

○次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい。」

○次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

〔用法・用量〕

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	1 包	2 回
7才以上15才未満	2／3 包	
1才以上7才未満	1／2 包	
1才未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

- （1）用法・用量を厳守すること。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

（裏面につづく）

〔成分・分量〕

1 日量（2 包）中

成 分	含 量	は た ら き
アスコルビン酸散	506mg	・コラーゲンの生成に関与します。 ・皮ふのやわらかさやしなやかさを保ちます。 ・血管を丈夫にし、出血を予防します。
アスコルビン酸(V. C)として	500mg	
リボフラビン(V. B ₂)	2mg	・荒れた皮ふを正常な状態に戻すはたらきがあります。
塩酸ピリドキシン(V. B ₆)	10mg	
パントテン酸カルシウム	10mg	

添加物として白糖、D-マンニトール、ポビドン、乳糖、無水ケイ酸、エチルセルロース、香料を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、医師の治療を受ける場合は、アスコルビン酸（ビタミンC）を含有する製剤を服用していることを医師にお知らせ下さい。
- (2) 本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン（ビタミンB₂）を含有するためですからご心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5) 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用すること。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：03(3370)7174(代表)
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発 売 元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 牛 津 製 薬 株 式 会 社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2