

ご使用に際して、この説明書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。

ビタミンA、D、E、カルシウム配合、ゼリータイプの…

パパーホワイトゼリー

医薬品

ビタミンAD主薬製剤

パパーホワイトゼリーは、ビタミンA、D、Eとカルシウムをバランス良く配合したゼリータイプのビタミン剤で甘くてあとくちが良く、水なしで、かんで服用していただけます。ゼリーに自然の原料 寒天を使用し、着色料や香料は無添加です。

大切な発育期のお子さまに適し、お母さまや家族の方にも摂取していただけます。

こんな方のビタミンA、Dの補給に、おすすめします。

- ・発育期のお子さまに
- ・妊娠・授乳期のお母さまに
- ・病中病後で体力が低下している方に
- ・おじいさま、おばあさまにも

○有効成分の働き

ビタミンA	目の乾燥感を緩和します。夜盲症にも。
ビタミンD ₃	腸からのカルシウムなどの吸収を促進して骨や歯をつくる機能を高めます。くる病の予防にも。

○カロリーは4粒（成人1日量）で約17kcalです。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります。）
次の人は服用しないでください。

- 本剤は、乳児（1歳未満）に服用させないでください。



相談すること

1. 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊娠3ヶ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人、又は妊娠を希望する人。（妊娠3ヶ月前から妊娠3ヶ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に、先天異常の割合が上昇したとの報告があります。）

2. 次の場合直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢



効能・効果、用法・用量と注意、成分・分量、保管及び取扱上の注意、問い合わせ先については、裏面をよく読んでください。

[効能・効果]

次の場合のビタミンADの補給：発育期、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
骨歯の発育不良
くる病の予防
次の症状の緩和：目の乾燥感
夜盲症（とり目）

[用法・用量]

次の量をかんで服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2粒	朝夕2回
小児（1歳～14歳）	1粒	朝夕2回
1歳未満	服用しないこと	

[用法・用量についての注意]

- (1) 本剤は必ずかんで服用してください。
- (2) 定められた用法・用量をお守りください。
- (3) 本剤を幼児（1歳～6歳）に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないようよく注意してください。
- (4) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[成分・分量]

成 分	1日量（4粒中）
ビタミンA	4mg（4000国際単位）
ビタミンD ₃	0.01mg（400国際単位）
ビタミンE 酢酸エステル	20mg
リン酸水素カルシウム	430mg（カルシウムとして100mg）

添加物として、水アメ、白糖、カンテン、ペクチン、pH調整剤、その他2成分を含む。

[保管及び取扱上の注意]

- (1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限（容器の底又は側面に記載しています）の過ぎたものは服用しないでください。

○ご存知ですか！

- ・ゼリーの原料に使用しているカンテンは、海に生育するテングサ等の海藻から作られています。
- ・くる病は、ビタミンDが欠乏して骨へのカルシウム沈着が起きなくなり、骨が軟化し変形してしまう病気です。

[問い合わせ先]

大木製薬株式会社「お客さま相談室」まで。 受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）
☎ 03-3256-5051

製造販売元



大木製薬株式会社

東京都千代田区神田鍛冶町3-3