

口内炎・皮膚炎

エマフラシン®シロップ

特徴

エマフラシンシロップは、リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB₂）・ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）をはじめとするビタミン群にヨクイニンエキスを配合した口内炎、皮膚炎等の治療内服薬です。



使用上の注意



相談すること

1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

- 次の諸症状の緩和：口内炎、皮膚炎、舌炎、口角炎、口唇炎、湿疹、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンB₂B₆の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

〔用法・用量〕

下記の量を服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15才以上）	10mL	1 回
11才以上15才未満	8 mL	
7 才以上11才未満	6 mL	
3 才以上 7 才未満	4 mL	
1 才以上 3 才未満	3 mL	
6 ヶ月以上 1 才未満	2 mL	
6 ヶ月未満	服用しないこと	

※添付の計量コップをご使用ください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) ビンに直接口をつけて飲まないこと。
- (4) 計量コップに注いだ薬液をビンに戻さないこと。
- (5) 開栓後、味・においに明らかな変化があり異常を感じた場合には、直ちに服用を中止すること。

（裏面につづく）

〔成分・分量〕

1 日量（10mL）中

成 分	含 量
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB ₂ ）	20mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	50mg
パントテン酸カルシウム	25mg
ニコチン酸アミド	50mg
ヨクイニンエキス（ヨクイニン流エキス）	1 mL （ヨクイニンとして1,000mg）

添加物として白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、カラメル、酒石酸、安息香酸Na、メタリン酸Na、ポリリン酸Na、パラベン、エタノールを含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

- （1）本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB₂）を含有するためですから、ご心配ありません。
- （2）気温や液温等により多少の色、味、香り等が異なる場合があります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- （2）小児の手の届かない所に保管すること。
- （3）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後は、品質を保持するため用法・用量を守りなるべく早く服用すること。
- （5）薬液を添付の計量コップに注いだ後は、ビン口をよく拭いて清潔にすること。また、使用した計量コップは、その都度、水でよく洗うこと。
- （6）水およびその他の異物が混入しないように注意すること。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電 話：03（3370）7174（代表）
受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

発 売 元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 牛 津 製 薬 株 式 会 社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2