

第3類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビハクは…

ビタミンB₂B₆主薬製剤

肌あれ、にきび、口内炎に

ビハク®

ビタミンB₂、活性型ビタミンB₆、
ヨクイニン配合

- 肌あれ、にきび、口内炎などのお肌や粘膜の症状に効果をあらわすビタミンB₂、活性型ビタミンB₆と生薬ヨクイニン（ハトムギの種子）エキスを配合しています。
- ビタミンB₂、B₆は皮脂の分泌を抑え、にきびに効果をあらわします。
- オレンジ色の糖衣錠です。



使用上の注意



相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、腹部膨満感

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合



〔効 能〕

- 次の諸症状の緩和：

肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、湿疹、皮ふ炎、かぶれ、ただれ
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。」

- 次の場合のビタミンB₂・B₆の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

〔用法・用量〕

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1～2錠	1回
7～14才	1錠	
7才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量と働き〕2錠中

成 分	分 量	働 き
ビタミンB ₂ (リボフラビン)	30mg	皮脂の分泌を抑え、にきびに効果をあらわします。また、口中の粘膜に働き、口内炎に効果をあらわします。
リン酸ピリドキサル (活性型ビタミンB ₆)	20mg	ビタミンB ₂ と働きあって、皮膚の新陳代謝を活発にし、皮膚炎などのお肌のトラブルや口内炎に効果をあらわします。
ニコチン酸アミド ピオチン	30mg 30 μ g	ビタミンB群の一種で皮膚粘膜の健康に役立ちます。
ヨクイニン乾燥エキス	184.6mg (ヨクイニンとして2,400mg)	肌あれに効果をあらわします。

添加物として、CMC、乳糖、バレイシヨデンブ、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、白糖、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポビドン、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、黄色5号、カルナウバロウを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤はビタミンB₂を含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。

◎保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)

(4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



ビタミンの知識

ビタミンは食品から摂取しなければならない大切な栄養素です。ビタミンB₂、B₆の不足は、乳製品、肉類、豆類などの食品を十分に摂らなかったり、飲酒、かぜなどによる発熱、抗生物質の服用などにより体内のビタミンB₂、B₆がたくさん消耗されるために起こります。健康は正しい食生活から生まれます。好き嫌いをなくし、栄養バランスのよい食事を心がけることが大切です。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号