

ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

KN090610
0242

0242

ビタミンE C製剤 ビタミンB₂配合

第3類医薬品

ビタミンEC-L錠「クニヒロ」

ビタミンEは、動脈硬化などの原因となる過酸化脂質の増加を防ぐとともに、末梢血管の血液循環を促進するため、血行を良くし、末梢血行障害によって起こる様々な症状を緩和します。

また、ビタミンCは、しみ、そばかすの原因となるメラニン色素の生成を抑制して皮膚の色素沈着を緩和します。さらに細胞と細胞をつなぐタンパク質であるコラーゲンの生成に役立ち、毛細血管を強化し、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。

ビタミンEC-L錠「クニヒロ」は、水なしでかんで服用できるチュアブル錠で、ビタミンEとビタミンCを主成分として、さらに持続型のビタミンB₂を配合した製品です。



⚠️【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師または薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、胃部不快感

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師または薬剤師に相談してください。
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
便秘、下痢

【成 分】 1日量（6錠）中

ビタミンEコハク酸エステルカルシウム…………… 310.74mg
(d l- α -トコフェロールコハク酸エステルとして…………… 300mg)
アスコルビン酸（ビタミンC）…………… 1000mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB₂酪酸エステル）…………… 12mg
添加物として、白糖、ブドウ糖、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

＜成分に関連する注意＞

- (1) 本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。
- (2) 本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB₂酪酸エステル）によるものですので心配ありません。

（裏面もお読みください）

[効能・効果]

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和：
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：
歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンE Cの補給：
肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

[用法・用量]

次の1回量を食後に口の中で溶かすか、またはかみくだいて服用してください。ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	2 錠	1～3回
11歳以上15歳未満	1 錠	2～3回
7歳以上11歳未満	1 錠	1～3回
7歳未満の乳幼児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤を長時間なめ続けると上あごのあたりに成分であるビタミンEが付着する場合があります。長時間なめ続けず、できるだけかみくだいて服用してください。

[保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。なお、本剤は特に吸湿しやすい製剤ですから、服用のつどビンの中をフタをよくしめてください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、フタをあけた後はすててください。
- (5) 箱およびビンの「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、ビンはこの文書とともに箱に入れたまま保管してください。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点から6ヵ月以内に服用してください。なお使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社