

第3類医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

天然型ビタミンE・C主薬製剤

新ビタレオンEC〈ナチュラル〉

しみ、そばかすや肩こり、手足の冷えの緩和のビタミンEC補給に

- 新ビタレオンEC (ナチュラル)**は、天然型ビタミンE、ビタミンC、ビタミンB₂、ビタミンB₆等の各種ビタミンを配合した、甘酸っぱくて、スツツと溶け、服用しやすい顆粒状のビタミンEC製剤です。
- 新ビタレオンEC (ナチュラル)**は、肩のこり、手足の冷えなどの末梢血行障害による諸症状の緩和に、更にしみやそばかす、日やけなどの色素沈着に、歯ぐきからの出血予防に効果をあらわします。また、肉体疲労時や老年期のビタミンECの補給にも役立ちます。
- 新ビタレオンEC (ナチュラル)**の顆粒の色はビタミンB₂（リボフラビン酪酸エステル）によるもので、色素は一切使っておりません。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)次の診断を受けた人。

フェニルケトン尿症

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、胃部不快感

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。

4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

便秘、下痢

効能又は効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。」
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

裏面もお読みください

用法及び用量

次の量を、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩、食後に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15歳以上)	1 包	2 回(朝夕) 3 回(朝昼晩)
11～14歳	2/3包	
7～10歳	1/2包	
3～6 歳	1/3包	
3 歳未満	服用しないこと	

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法、用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないようよく注意してください。

成分及び分量

3包中

成 分	含量	は た ら き
酢酸 d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	300mg	末梢血行障害による、手足の冷えや肩・首すじのこりなどを緩和します。 過酸化脂質の増加を抑えます。
アスコルビン酸 (ビタミンC)	2000mg	メラニンの生成を抑制し、しみやそばかすによる色素沈着を緩和します。
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	12mg	「皮膚のビタミン」といわれており、皮膚の新陳代謝や脂質代謝を促進し、お肌を健康に保ちます。また、リボフラビン酪酸エステルは、持続型のビタミンB ₂ です。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50mg	脂質やタンパク質の代謝を促進し、皮膚の健康を保ちます。
ニコチン酸アミド	60mg	糖質の代謝を促進します。

添加物としてアスパルテム(L-フェニルアラニン化合物)、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、部分アルファー化デンプン、キシリトール、ステアリン酸Mg、香料、エタノールを含有する。

＜成分及び分量に関連する注意＞

- (1)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。尿及び大便の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせください。
- (2)本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂酪酸エステル)によるものです。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

問い合わせ先

- 1) 本製品の購入先
- 2) 佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室

TEL 0744-28-0021

受付時間 9:00～16:30(土・日・祝日を除く)



佐藤薬品工業株式会社

奈良県橿原市観音寺町9番地の2