第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミンEC主薬製剤

# 新ビタレオンEC〈ナチュレ〉

しみ、そばかすや肩こり、手足の冷えの緩和のビタミンEC補給に

- ○新ビタレオンEC(ナチュル)は、天然型ビタミンE、ビタミンC、ビタミンB<sub>2</sub>、ビタミン B<sub>6</sub>等の各種ビタミンを配合した、甘酸っぱくて、スッと溶け、服用しやすい顆粒 状のビタミンEC製剤です。
- ○新ビタレオンEC(ナチュレ)は、肩のこり、手足の冷え等の末梢血行障害による諸症状の緩和に、更にしみやそばかす、日やけ等の色素沈着に、歯ぐきからの出血予防に効果をあらわします。また、肉体疲労時や老年期のビタミンECの補給にも役立ちます。
- ○新ビタレオンEC(ナチュレ)の顆粒の色はビタミンB2(リボフラビン酪酸エステル)によるもので、色素は一切使っておりません。

# ⚠ 使用上の注意



# 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3)次の診断を受けた人。
    - フェニルケトン尿症
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症  状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、下痢

- 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師 又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

- ○末梢血行障害による次の諸症状の緩和:肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、 しもやけ
- ○次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- ○次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合 は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。|
- ○次の場合のビタミンECの補給:肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

## 用法・用量

次の量を、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩、食後に 服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15歳以上)	1 包	
11歳以上15歳未満	2/3包	2 回 (朝夕)
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上7歳未満	1/3包	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3 歳未満	服用しないでください	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

# 成分・分量

3包中

成 分	含 量
酢酸 d - α - トコフェロール(天然型ビタミンE)	300mg
アスコルビン酸 (ビタミンC)	2000mg
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB2酪酸エステル)	12mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> )	50mg
ニコチン酸アミド	60mg

- 添加物:アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、部分アルファー化デンプン、キシリトール、ステアリン酸Mg、香料、エタノール

#### 〈成分・分量に関連する注意〉

- (1)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。尿及び 大便の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医 師にお知らせください。
- (2)本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン酪酸エステル (ビタミン $B_2$ 酪酸エステル) によるものです。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内 に服用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

#### お問い合わせ先

- (1)本製品の購入先
- (2)佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室

TEL 0744-28-0021

受付時間 9:00~16:30 (土・日・祝日を除く)

